

AMINOSTIM

FICHA TECNICA

1. GENERALIDADES

AMINOSTIM, ES UN FERTILIZANTE COMPLEJO PK PARA APLICACIÓN FOLIAR.

2. CARACTERISTICAS

AMINOSTIM, es un Bio-complejo nutricional compuesto por 17 L- α aminoácidos de alta pureza y por nutrientes mayores enriquecidos en potasio, por elementos menores técnicamente balanceados. Todo el contenido nutricional se encuentra quelatado orgánicamente, lo cual permite aprovechar el efecto de los aminoácidos en el metabolismo del potasio y de los demás nutrientes para lograr así mejor uniformidad y calidad de las cosechas.

AMINOSTIM, se recomienda especialmente para regular la formación, cuajado, llenado de granos, frutos y tubérculos en la fase de producción y adicionalmente para incrementar la concentración de carbohidratos y de los grados Brix.

AMINOSTIM, también actúa como bio-recuperador de situaciones extremas causadas por heladas, sequias, inundaciones, fitotoxicidad y granizadas.

AMINOSTIM, no contiene nitrógeno lo que permite su uso en épocas de lluvias.

3. REGISTRO DE VENTA ICA No 5639

A nombre de BIOSINTESIS S.A.S

4. COMPOSICION GARANTIZADA

	g/l		g/l
FOSFORO ASIMILABLE (P₂O₅).....	60.00	COBRE (Cu).....	1.10
POTASIO SOLUBLE EN AGUA (K₂O).....	300.00	HIERRO (Fe).....	0.12
MAGNESIO (MgO).....	5.00	MANGANESO (Mn).....	0.92
AZUFRE TOTAL.....	8.00	ZINC (Zn).....	3.12
BORO(B).....	0.54	*AMINOACIDOS LIBRES 17 (L-α).....	45.00
*AMINOACIDOS LIBRES:			
Acido Aspártico, Acido Glutámico, Alanina, Arginina, Cisteina, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina y Valina.			
Ph en solución al 10%: 13.0		Densidad a 20°C: 1.3 g/ml	

5. USOS Y DOSIS

La dosis recomendada de **AMINOSTIM** en el cultivo de papa y demás cultivos es de 1.25 Lts/Ha ó 250 c.c por caneca de 200 litros de agua (25 c.c por bomba de 20 litros de agua).

6. EPOCAS DE APLICACIÓN

AMINOSTIM se recomienda aplicarlo en la mayoría de los cultivos. En el cultivo de la papa se pueden realizar dos a tres aplicaciones: **Después de iniciada la florescencia con intervalos de 20 días.**

LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

LA FERTILIZACION FOLIAR COMPLEMENTA MAS NO SUSTITUYE LA FERTILIZACION EDAFICA.

PARA LA VENTA Y APLICACIÓN DE ESTE FERTILIAZANTE ES RECOMENDABLE LA PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO, CON BASE EN EL ANALISIS DE SUELOS O DEL TEJIDO FOLIAR.

7. PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños.

AMINOSTIM, no es toxico para humanos ni para animales; sin embargo, evite su ingestión, así como el contacto de los ojos y la piel porque puede causar irritación.

8. MEDIDAS DE MANEJO Y APLICACIÓN

OBSERVACIONES: cuando utilice **AMINOSTIM** se recomienda guardar las medidas de precaución necesarias en su uso y manejo.

Utilice equipo de protección: botas, overol, guantes, dosificador y aplicador. No comer, no fumar y no beber durante el manejo y aplicación de este producto. Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

El operario debe lavarse con abundante agua y jabón después de la aplicación.

9. MEDIDAS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Cualquier residuo de este embase es soluble en agua. Enjuague el recipiente con agua y añada la solución al tanque de fumigación.

10.COMPATIBILIDAD

AMINOSTIM se puede mezclar con la mayoría de los Agroquímicos del mercado. Se recomienda hacer pruebas físicas previas en caso de duda.

11.FITOTOXICIDAD

AMINOSTIM no es fitotóxico utilizando las dosis recomendadas por el fabricante.